

## ⑥ スイートコーンを育てる

# 収穫適期は2, 3日

スイートコーンはイネ科の野菜で、茎の先端に雄花、茎の途中に雌花がつく雌雄異花植物です。発芽適温25～30度、生育適温は22～30度。排水良好で有機質が多く通気性の良い土壌を好みます。日照は多いほど生育が良く、水分を好み、穂ができるとき、開花時期に特に必要とします。連作は好まず、2, 3年間隔をあけて栽培します。

### 1. 品種

「サニーショコラ」は播種後85日程度で収穫できる中生の黄色粒種。「ゴールドラッシュ」は83日程度で収穫できる早生の黄色粒種でいずれも食味が良いです。

### 2. 畑の準備

種播きの2週間前に苦土石灰を1平方メートルあたり100グラム散布し耕うんします。その1週間後に堆肥2キロ、化成肥料（成分15・15・15）200グラム、ヨウリンを30グラム散布し耕うんします。

### 3. 播種

畝幅150センチ（床幅1メートル、通路50センチ）の畝を立て、条間45センチ、株間30センチで、播種は1穴に3粒播きまします。鳥対策としてテグスを張ります。

### 4. 間引き、追肥

本葉2枚の頃に1穴に2本になるように生育の悪い苗をハサミで切り取ります。その後本葉5, 6枚の頃に1穴に1本にします。

### 5. 管理

2回目の間引き時に追肥用化成肥料を1平方メートルあたり30グラム施します。風で倒れないようにクワで株元に土寄せします。この時、根を切らないようにします。2回目は先端に雄穂が出る前に、追肥用化成肥料を1平方メートルあたり30グラム施します。アナグマが侵入する場所では電気柵の設置が必要です。

### 6. 害虫

雄穂が出る頃にアワノメイガ雌穂から絹糸が出たらアブラムシが発生しやすくなるので、雌穂、雄穂のところに殺虫剤を散布します。

### 7. 収穫

絹糸（ひげ）が出る前に1株に雌穂を上から1～2つだけ残し、他は摘み取りヤングコーンとして利用します。残りは絹糸が茶色になったら収穫します。収穫適期は2, 3日と短く、遅れると固くなるので注意します。



（鹿児島市都市農業センター）